


COLETA DE ASPIRADO NASO/OROFARÍNGEO EM RECÉM NASCIDO


1.Higienizar as mãos; Preparar o material; realizar a paramentação




2. Embrulhar o bebê e efetuar mensuração da sonda, do lóbulo da orelha a ponta do nariz




3. Aspirar 1ml de SF 0,9%, preencher a sonda com 0,5ml; introduzir na narina direita do bebê até a altura marcada




4. Destilar o 0,5ml de SF 0,9% na narina direita e imediatamente aspirar com a seringa; introduzir o conteúdo aspirado no frasco



5. Repetir o procedimento na narina esquerda e depositar o conteúdo aspirado no mesmo frasco



6. Aspirar 0,5ml de SF 0,9% na seringa, introduzir a sonda em orofaringe e aspirar o conteúdo



7. Depositar o conteúdo aspirado no mesmo frasco. Conferir a identificação e encaminhar a amostra.



Médico solicita	Código da etiqueta	Número Frascos	Destino
Covid	COVCA	1	HC
Sincicial	CVSRTR	1	CAISM
Teste rápido influenza	CINFLUTR	1	CAISM
SRAG	COVCA + H1N1	2	HC e CAISM

Exemplos:

COVID + SINCICIAL + TESTE RÁPIDO INFLUENZA = 2 frascos
COVID + SINCICIAL + H1N1 (LUTZ) = 3 frascos
SINCICIAL + SRAG = 2 frascos
SRAG = 2 frascos

Elaborado por: Daniela Turole; Cristiane Sanches; Samilly Farias; Lídia Beraldo; Adriana Souza

se pedidos
simultaneamente, pode
enviar um frasco só