

ANAFILAXIA na Criança e no Adolescentes

Sinais/Sintomas

- Urticária
- Angioedema
- Comprometimento respiratório
- Hipotensão arterial
- Sintomas gastrointestinais

ALERTA

Dois ou mais sintomas imediatamente após a exposição do possível alérgeno deve ser um sinal de alerta!

TRATAMENTO

1

Administração rápida de ADRENALINA

Droga de primeira linha, sua prescrição precoce é fundamental

1:1000 (1 mg/ml)

Crianças até 5 anos: 0,15mg

Crianças entre 6 e 12 anos: 0,3mg

Adolescentes e adultos: 0,5 mg (dose máxima)

IM face ântero-lateral da coxa

2

Colocar paciente em decúbito dorsal, com MMII elevados


Checar SINAIS VITAIS

A – Vias aéreas.

B – Respiração

C – Circulação

D – Estado neurológico



portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br

ANAFILAXIA na Criança e no Adolescentes

Já administrou
ADRENALINA?

OUTROS CUIDADOS

3

Suplementação de oxigênio, se saturação $\leq 95\%$

Via inalatória

SUPLEMENTAÇÃO DE O₂

- Cânula nasal ou máscara

Manter saturação de oxigênio.

- Se a saturação $\leq 95\%$, repetir dose de Adrenalina.

Via inalatória

REVERSÃO DE BRONCOESPASMO

- Sulfato de Salbutamol


Nebulizador

Solução para nebulização gotas (5 mg/ml)

- Crianças 0,07 – 0,15 mg/kg a cada 20 min até 3 doses. Dose máxima: 5 mg.
- Adolescentes: 2,5 – 5,0 mg, a cada 20 min. Dose máxima: 3 doses.

Aerosol Dosimetrado com espaçador (100mcg/jato)

- Crianças: 50 mcg/kg/dose = 1 jato/2 kg. Dose máxima 10 jatos.
- Adolescentes: 4 – 8 jatos, a cada 20 min. Dose máxima: 20 jatos.



portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br

ANAFILAXIA na Criança e no Adolescentes

Já administrou
ADRENALINA?

OUTROS CUIDADOS

4

Manutenção adequada da volemia (Soro fisiológico 0,9%)

EV

Crianças:

- 5 a 10ml/kg -> primeiros 5 minutos
- 30 ml/kg -> primeira hora

Adolescentes:

- 1 a 2 litros -> rapidamente

USO DE ANTIHISTAMÍNICOS

- Prometazina
- Difenidramida

Crianças:

- 1 mg/kg intravenoso até máximo de 50 mg

Adolescentes:

- 25 – 50 mg intravenoso

USO DE GLICOCORTICÓIDES

- Metilprednisona
- Prednisona

Metilprednisona: 1 – 2 mg/kg/dia intravenoso.
Prednisolona: 1mg – 2 mg/kg/dia via oral.

Observação clínica de casos leves deve ser de 6h a 8h e de casos graves de 24h a 48h.
Atenção à reação bifásica.



portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br